EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL

Traumatická zástava oběhu

ČRR

Pacient s traumatem

Zástava oběhu / hrozící zástava oběhu?

Zvažte netraumatickou příčinu

PRAVDĚPO-DOBNÁ → **Univerzální algoritmus ALS**

NEPRAVDĚPODOBNÁ

Hypoxie
Tenzní pneumotorax
Tamponáda srdeční
Hypovolémie

Zahajte léčbu reverzibilních příčin

1. **Zastavte masivní krvácení**
2. **Zajistěte dýchací cesty a maximalizujte oxygenaci**
3. **Bilaterální dekomprese hrudníku**
4. **Léčba srdeční tamponády**
5. **Chirurgická zástava krvácení nebo komprese proximální aorty**
6. **Masivní transfúzní protokol a tekutiny**

Současně zahajte / pokračujte v ALS

Prodleva od vzniku zástavy < 10 minut?
Praxe?
Pomůcky?
Prostředí?

Zvažte okamžitou resuscitační torakotomii

Obnovení spontánního oběhu?

NE → **Zvažte ukončení KPR**

ANO

Přednemocniční fáze:
- **Provádějte pouze život zachraňující výkony**
- **Okamžitý transport do vhodné nemocnice**

Nemocniční fáze:
- **Postupujte podle zásad "damage control"**
- **Definitivní zástava krvácení**

www.erc.edu | info@erc.edu | www.resuscitace.cz | info@resuscitace.cz
Vydala v říjnu 2015 Evropská resuscitační rada (ERC), Emile Vanderveldelaan 35, 2845 Niel, Belgium
Copyright: © Evropská resuscitační rada (ERC) Referenční číslo: Poster_SpecCircs_TraumaticCardiacArrest_Algorithm_CZ_20160504